令和7年4月分　学校給食物資加工品配合割合



2025/3/14

| 日 | 8日（火） | | 8日（火） | | 8日（火） | | 9日（水） | | 9日（水） | | 10日（木） | | 10日（木） | | 11日（金） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南地区 | NO1. | | NO1. | | NO1. | | NO6. | | NO6. | | NO14. | | NO14. | | NO3. | |
| R7.4 | ハンバーグ | | 大豆フレーク | | お祝いゼリー(中) | | 青のり粉 | | おから(乾燥) | | はちみつ | | コーンペースト(冷) | | 福神漬け | |
| | ニチレイフーズ | | 大島食品工業 | | 日東ベスト | | 小善本店 | | みすずｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(e-ﾊﾟｯｸ) | | 正栄 | | モリタン | | アサダ | |
| 配合割合（%） | 豚肉 | 20.92 | 大豆 | 100 | いちごピューレー | 12.9 | アオサ | 100 | 大豆 | 100 | はちみつ | 100 | とうもろこし | 100 | だいこん | 51.57 |
| | 鶏肉 | 19.46 | | | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖 | 8.8 | | | 消泡剤製剤 | Φ | | | | | うり | 5.16 |
| | たまねぎ | 21.41 | | | 豆乳加工食品 | 6.6 | | | | | | | | | きゅうり | 2.58 |
| | 粒状植物性たん白 | 16.06 | | | いちご果汁 | 6.4 | | | | | | | | | なす | 2.58 |
| | 豚脂 | 5.84 | | | 砂糖 | 6.2 | | | | | | | | | れんこん | 2.58 |
| | 難消化性デキストリン | 1.99 | | | ぶどう糖 | 3.7 | | | | | | | | | しょうが | 1.55 |
| | 果糖ぶどう糖液糖 | 1.46 | | | 水あめ | 0.3 | | | | | | | | | なた豆 | 0.77 |
| | でん粉 | 0.94 | | | 水 | 53.7 | | | | | | | | | しその葉 | 0.21 |
| | 粉末状植物性たん白 | 0.39 | | | 乳酸カルシウム | 0.8 | | | | | | | | | 砂糖 | 17.54 |
| | ドロマイト | 1.03 | | | ゲル化剤 | 0.3 | | | | | | | | | しょうゆ | 11.86 |
| | ぶどう糖加工品 | 0.97 | | | 酸味料 | 0.2 | | | | | | | | | 醸造酢 | 2.1 |
| | ポークエキス | 0.88 | | | ビタミンC | 0.1 | | | | | | | | | 食塩 | 1.29 |
| | 発酵調味料 | 0.49 | | | 紅麹色素 | 使用 | | | | | | | | | 酸味料 | 0.21 |
| | 食塩 | 0.35 | | | 安定剤 | 使用 | | | | | | | | | | |
| | 加工油脂 | 0.30 | | | 乳化剤 | 使用 | | | | | | | | | | |
| | 酵母エキス | 0.29 | | | 香料 | 使用 | | | | | | | | | | |
| | チキンブイヨン | 0.19 | | | pH調整剤 | 使用 | | | | | | | | | | |
| | 加工でん粉 | 0.63 | | | セルロース | 使用 | | | | | | | | | | |
| | クエン酸鉄ナトリウム | 0.06 | | | ピロリン酸第二鉄 | 使用 | | | | | | | | | | |
| | その他ｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ等 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水 | 6.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ＜コンタミ＞<br>無し | | ＜コンタミ＞<br>無し | | ＜同一ライン使用＞<br>卵　乳　オレンジ<br>キウイ　もも　りんご<br>ゼラチン　バナナ<br>ごま<br>＜同一工場内使用＞<br>小麦　アーモンド | | ＜注意喚起＞<br>アオサは「えび、かに」が混ざる漁法で採取しています | | ＜コンタミ＞<br>無し | | | | ＜コンタミ＞<br>無し | | ＜同一工場内使用＞<br>小麦　りんご　ごま | |
| | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆　鶏肉　豚肉 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>無し | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>無し | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>無し | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆 | |

令和7年4月分　学校給食物資加工品配合割合



2025/3/14

| 日 | 11日（金） | | 14日（月） | | 14日（月） | | 14日（月） | | 15日（火） | | 16日（水） | | 17日（木） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南地区 | NO3. | | NO10. | | NO10. | | NO10. | | NO15. | | NO13. | | NO11. | |
| R7.4 | お祝いゼリー(小) | | 豆腐（冷） | | 肉シューマイ(小) | | コーンシューマイ(中) | | はるさめ | | のりの佃煮(中) | | ダイスゼリー(いちご) | | 沢あざみ(ロング) | |
| | ヤヨイサンフーズ | | マメックス | | 四国日清食品(ルナフーズ) | | ヤヨイサンフーズ | | 誠和貿易 | | タカ食品工業 | | ヤヨイサンフーズ | | 加藤TMホールディングス | |
| 配合割合（%） | 砂糖 | 8.6 | 豆乳 | 93.5 | 豚肉 | 50.0 | とうもろこし | 32.7 | 緑豆 | 75 | 水あめ | 18.7 | 果糖ぶどう糖液糖 | 15.0 | 沢あざみ | 100 |
| | 果糖ぶどう糖液糖 | 7.3 | とうもろこしでん粉 | 0.3 | たまねぎ | 27.6 | たまねぎ | 11.6 | えんどう豆 | 25 | 砂糖 | 9.98 | 砂糖 | 8.0 | | |
| | 水あめ | 5.0 | 加工でん粉 | 1.2 | パン粉 | 4.7 | 魚肉すり身 | 7.2 | | | しょうゆ | 26.68 | ぶどう糖 | 2.0 | | |
| | ぶどう糖 | 3.9 | 凝固剤製剤 | 0.83 | でん粉 | 4.7 | 豚脂 | 7.2 | | | みりん | 5.54 | いちご果汁 | 1.5 | | |
| | 豆乳クリーム | 15.7 | 水 | 4.17 | しょうがペースト | 0.4 | でん粉 | 3.6 | | | のり | 3.74 | 水 | 70.6 | | |
| | いちご | 0.7 | | | 調味料 | 3.2 | 豆腐 | 3.6 | | | ひじき | 2.49 | ゲル化剤 | 1.2 | | |
| | 水 | 57.2 | | | 砂糖 | | 植物性たん白 | 2.5 | | | にぼし | 0.52 | 乳酸カルシウム | 0.9 | | |
| | ゲル化剤 | 1.1 | | | 食塩 | | パン粉 | 1.4 | | | かつお | 0.27 | 香料 | 0.4 | | |
| | 炭酸カルシウム | 0.2 | | | 酵母エキス | | みりん | 0.7 | | | 水 | 31.22 | 酸味料 | 0.2 | | |
| | 香料 | 0.2 | | | ポークエキス | | 焼酎 | 0.4 | | | 増粘多糖類 | 0.56 | クエン酸鉄ナトリウム | 0.1 | | |
| | 酸味料 | 0.1 | | | 香辛料 | | 小麦粉 | 11.1 | | | ヘム鉄 | 0.30 | ビタミンC | 0.1 | | |
| | 紅麹色素 | Φ | | | 皮 | 9.4 | 水 | 12.1 | | | | | 着色料 | Φ | | |
| | | | | | 小麦粉 | | 砂糖 | 0.8 | | | | | | | | |
| | | | | | 還元水あめ | | 食塩 | 0.7 | | | | | | | | |
| | | | | | 水 | | 水あめ混合異性化液糖 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 酵母エキスパウダー | 0.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 加工デンプン | 3.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 炭酸カルシウム | 0.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | ピロリン酸鉄 | Φ | | | | | | | | |
| | | | | | | | 乳化剤 | Φ | | | | | | | | |
| | | | | | | | 豆腐用凝固剤 | Φ | | | | | | | | |
| | ＜同一工場内使用＞<br>小麦　卵　乳 | | ＜同一工場内使用＞<br>小麦 | | ＜同一ライン使用＞<br>えび　かに　卵　乳<br>いか　牛肉　さけ<br>さば　大豆　鶏肉<br>やまいも　りんご<br>ゼラチン　ごま | | ＜同一工場内使用＞<br>えび　かに　卵<br>乳　ごま | | ＜コンタミ＞<br>無し | | ＜同一ライン使用＞<br>乳　落花生　オレンジ<br>バナナ　りんご　もも<br>＜同一工場内使用＞<br>ごま | | ＜同一工場内使用＞<br>小麦　卵　乳 | | ＜コンタミ＞<br>無し | |
| | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>小麦　豚肉 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆　小麦　豚肉<br>（魚介類） | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>無し | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>小麦　大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>無し | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>無し | |

令和7年4月分　学校給食物資加工品配合割合



2025/3/14

| 日 | 17日（木） | | 18日（金） | | 18日（金） | | 21日（月） | | 21日（月） | | 24日（木） | | 24日（木） | | 30日（水） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南地区 | NO11. | | NO16. | | NO16. | | NO12. | | NO12. | | NO7. | | NO7. | | NO5. | |
| R7.4 | かんぴょう(カット) | | 白身魚フライ | | ミニゼリー(中) | | 酒粕 | | ゼリー（中） | | いり卵 | | 玉はんぺん | | 厚揚げ(冷)10g | |
| | 赤羽根商店 | | 極洋 | | 富士正食品 | | 大関 | | ヤヨイサンフーズ | | ミヤシタフーズ | | かね貞 | | 不二製油 | |
| 配合割合（%） | ユウガオの実 | 100 | スケソウダラ | 50 | 異性化液糖 | 25.0 | 清酒粕 | 非開示 | みかん果汁(還元) | 11.9 | 鶏卵 | 71.35 | 魚肉すり身 | 76.1 | 豆乳 | 90.5 |
| | | | 食塩 | 微量 | アセロラ濃縮果汁 | 2.0 | 食塩 | | 果糖 | 6.5 | 植物油脂 | 3.26 | (イトヨリ ミックス) | | デキストリン | 1.8 |
| | | | 衣 | | 還元水あめ | 1.4 | 酵素剤 | | 砂糖 | 6.0 | 食塩 | 0.29 | 馬鈴薯でん粉 | 7.97 | でん粉 | 1.4 |
| | | | パン粉 | 27 | ゲル化剤 | 0.73 | 水 | | ぶどう糖 | 6.0 | 加工デンプン | 4.76 | 植物油(なたね、大豆) | 4.32 | ぶどう糖 | 0.2 |
| | | | 小麦粉 | 4.3 | 酸味料 | 0.4 | | | 水あめ | 5.0 | 乳酸ナトリウム | 2.85 | 砂糖 | 3.15 | なたね油 | − |
| | | | 食塩 | 0.3 | ﾑﾗｻｷｲﾓ色素・ﾄｳｶﾞﾗｼ色素 | 0.16 | | | 水 | 63.2 | クエン酸 | 0.14 | ぶどう糖 | 2.85 | 豆腐用凝固剤 | 0.7 |
| | | | 水 | 18.3 | ｸｴﾝ酸第一鉄ﾅﾄﾘｳﾑ | 0.103 | | | ゲル化剤 | 0.8 | 増粘剤 | 0.34 | 大豆たん白 | 1.52 | 水 | 5.4 |
| | | | 増粘剤 | 0.1 | 香料 | 0.1 | | | 酸味料 | 0.4 | カロチン色素 | 0.01 | 食塩 | 0.76 | | |
| | | | | | 消泡剤 | 0.03 | | | 香料 | 0.2 | アナトー色素 | 0.01 | タピオカでん粉 | 3.04 | | |
| | | | | | クチナシ赤色素 | 0.02 | | | クエン酸鉄ナトリウム | Φ | 水 | 16.99 | 塩化カリウム | 0.29 | | |
| | | | | | 水 | 70.057 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 魚肉には、イトヨリの他にﾀﾁｳｵ、ﾏﾏｶﾘ ｸﾞﾁ、ｷﾝﾄｷ、ｺﾁ ﾊﾓ、ｸﾛﾋﾗｱｼﾞ ｼﾏｱｼﾞ、ﾊｾﾞ、ﾋﾒｼﾞ ｴｿ、ﾊﾀ、ﾄﾋﾞｳｵ が含まれる可能性があります。 | | | |
| | ＜コンタミ＞ 無し | | ＜同一工場内使用＞ 乳 卵 小麦 いか さけ さば 大豆 鶏肉 豚肉 りんご ゼラチン ごま | | ＜同一工場内使用＞ 卵 乳 牛肉 鶏肉 豚肉 大豆 オレンジ もも りんご バナナ ゼラチン | | | | ＜同一工場内使用＞ 小麦 卵 乳 | | ＜同一工場内使用＞ 小麦 豚肉 鶏肉 乳 りんご さば ゼラチン | | ＜同一ライン使用＞ 卵 乳 小麦 えび かに いか ごま 鶏肉 豚肉 牛肉 山芋 りんご ゼラチン ＜注意喚起＞ 使用している魚は「えび、かに」を食べています | | ＜コンタミ＞ 無し | |
| | ＜アレルゲン表示対象＞ 無し | | ＜アレルゲン表示対象＞ 小麦 大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞ 無し | | ＜アレルゲン表示対象＞ 無し | | ＜アレルゲン表示対象＞ 無し | | ＜アレルゲン表示対象＞ 卵 大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞ 大豆 | | ＜アレルゲン表示対象＞ 大豆 | |

令和7年4月分　学校給食物資加工品配合割合


2025/3/14

| 日 | 30日（水） | | 30日（水） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南地区 | NO5. | | NO5. | | NO. | | NO. | | NO. | | |
| R7.4 | トック | | 大豆入り小魚(中) | | 〇 | | 〇 | | 〇 | | |
| | ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｰﾄﾞ(城北麺工) | | 藤沢商事 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 配合割合（%） | 白玉粉 | | 大豆 | 49.16 | | | | | | | |
| | 食塩 | | かたくちいわし | 34.9 | | | | | | | |
| | 加工でん粉 | | 砂糖 | 14.08 | | | | | | | |
| | 酒精 | | しょうゆ | 0.76 | | | | | | | |
| | | | ごま | 0.50 | | | | | | | |
| | | | 澱粉分解物 | 0.36 | | | | | | | |
| | | | 食塩 | 0.14 | | | | | | | |
| | | | 青粉 | 0.10 | | | | | | | |
| | ＜コンタミ＞<br>無し | | ＜同一ライン使用＞<br>落花生　えび　くるみ　バナナ　カシューナッツ　アーモンド<br>＜同一工場内使用＞<br>卵　乳　いか　キウイ<br>＜注意喚起＞<br>かたくちいわしは、えび、かにを食べています | | | | | | | | |
| | ＜アレルゲン表示対象＞<br>無し | | ＜アレルゲン表示対象＞<br>大豆　小麦　ごま | | | | | | | | |